



EL 18% DELS NENS REVISATS PER LA FUNDACIÓ IMO DEL 15 AL 19 D'ABRIL PRESENTA PROBLEMES OCULARS NO DIAGNOSTICATS

La Unitat de Diagnòstic Precoç de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) realitza 135 exploracions gratuïtes en el marc d'una campanya de prevenció d'oftalmologia pediàtrica

Barcelona 24 abril 2013 / Un total de 25 nens dels 134 revisats gratuïtament en la Unitat de Diagnòstic Precoç de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) amb motiu de la campanya de prevenció d'oftalmologia pediàtrica, impulsada del 15 al 19 d'abril per la Fundació IMO, presenta algun problema ocular no diagnosticat. En la majoria dels casos (48%), s'ha detectat algun defecte refractiu (miopia, hipermetropia o astigmatisme), encara que també s'han diagnosticat 5 casos d'ambliopia o "ull gandul", altres 5 d'estrabisme (pèrdua de paral·lelisme entre els dos ulls que provoca que cadascun miri en una direcció), i 3 casos d'altres problemes oftalmològics, com atròfia sectorial de l'iris (una cicatriu a aquesta part de l'ull), sincinèsia òculo-mandibular (obertura o tancament involuntari de l'ull en obrir la mandíbula) i blefaritis (inflamació de la parpella).

La campanya de revisions gratuïtes a nens d'entre 2 i 8 anys pretén posar de manifest el gran percentatge de patologia oculta a la infància i, al mateix temps, destacar la importància d'un diagnòstic precoç de les malalties de més prevalença durant els primers anys de vida. Detectar-les a temps és essencial per a un correcte desenvolupament visual, ja que, en molts casos, el tractament precoç evita que es prolonguin fins a l'edat adulta. Això passa per exemple, amb l'ambliopia (també coneguda com "ull gandul") que consisteix en la falta de desenvolupament d'un dels dos ulls per no fer-se servir durant l'etapa de desenvolupament visual. Segons la Dra. Ana Wert, del Departament d'Oftalmologia Pediàtrica de l'IMO, com més aviat es detecti l'ambliopia, més efectiu serà el tractament i aclareix que "els tractaments són excel·lents si es fan a partir dels 3 anys, mentre que a partir dels 7, són menys efectius i més enllà dels 9 anys, pràcticament nuls".

Les revisions oftalmològiques a la infància

La Fundació IMO recomana portar els nens a l'oftalmòleg abans dels 6 mesos per descartar anomalies congènites, com cataracta, glaucoma, malformacions o tumors i explorar de nou als nens abans dels 4 anys per detectar un possible estrabisme i / o ull gandul. També aconsella visitar l'oftalmòleg un cop l'any fins als 8-10 anys (quan ja s'ha desenvolupat el sistema visual) i destaca la importància que un oftalmòleg explori al nen davant qualsevol sospita d'anomalia ocular. Gairebé totes les malalties oculars infantils poden curar-se si es diagnostiquen de forma precoç.