



LA FUNDACIÓ IMO OFEREIX CONSELLS PRÀCTICS PER PROTEGIR LA VISIÓ A LA REVETLLA DE SANT JOAN

Distribueix 12.000 díptics informatius entre punts de venda de petards, farmàcies i òptiques, amb motiu de la campanya "A la revetlla, cal Tenir ull!"

Rentar amb aigua sense pressionar el globus ocular i acudir immediatament a un centre mèdic especialitzat són les dues mesures bàsiques per intentar evitar seqüeles greus en cas d'accident

Barcelona, 17 juny de 2013./ Els petards i els jocs amb foc poden ser especialment perillosos per als ulls si no s'utilitzen apropiadament i amb prudència, segons la Fundació IMO, que recomana extremar la precaució per protegir la visió a la revetlla de Sant Joan. La fragilitat de la zona ocular i la seva exposició al material pirotècnic, freqüentment manipulat de forma incorrecta, pot provocar importants lesions oculars que en la majoria dels casos es podrien prevenir.

Per això, la Fundació IMO ha impulsat per tercer any consecutiu la campanya [A la revetlla, cal tenir ull!](#) i ha distribuït 12.000 díptics informatius entre els principals punts de venda de petards, òptiques i farmàcies de Catalunya, en col·laboració amb l'Associació de Fabricants i Majoristes de Catalunya de Focs d'Artifici, el Col·legi Oficial d'Òptics optometristes de Catalunya i l'Associació de Farmàcies de Barcelona. A més, els consells de la Fundació IMO s'integren dins de la campanya [Revetlles amb precaució](#), que Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa a l'inici de cada temporada estival.

Com prevenir accidents

Segons explica el Dr. Daniel Elies, especialista en còrnia i cirurgia refractiva de l'IMO, la primera precaució és "no fabricar petards casolans i comprar el material pirotècnic en centres autoritzats, on ens puguin oferir normes d'ús i ens aconsellin en la selecció dels productes més adequats". A més, afegeix que "cal parar especial atenció als nens i als adolescents, supervisant no només quins materials adquireixen, sinó també com els manegen".

A l'hora de manipular petards, l'oftalmòleg de l'IMO recomana protegir els ulls amb ulleres especials i irrompibles, així com evitar acostar-se a mirar la metxa o a comprovar l'error de l'explosiu. En cas de no manipular directament el material pirotècnic, és igualment important mantenir-se el més allunyat possible, tenint en compte que la distància de seguretat ha de ser major com més potent sigui l'artefacte que utilitzem.

El Dr. Elies recorda que "cal tenir especial cura amb els explosius volàtils (com els coets) i evitar llançar petards en alt, ja que poden esclatar a l'altura de la cara i provocar severes lesions en la visió". De la mateixa manera, "és important vigilar amb la metralla, que pot danyar l'estructura ocular fins i tot a molts metres de distància, sobretot si es posen petards dins de maons, ampolles o qualsevol altre tipus de contenidors", afegeix.



Com actuar en cas d'accident

Si la lesió és purament ocular, el primer que hem de fer en cas d'accident és rentar l'ull amb aigua per treure les restes de metralla i evitar que segueixin cremant els teixits de la zona. L'especialista afirma que "no eliminar les partícules que queden a la ferida, pot provocar que aquesta deixi una cicatriu, s'infecti o, fins i tot, es faci més profunda, perforant i danyant les estructures oculars".

Per evitar-ho, és aconsellable rentar el contorn de l'ull amb aigua amarada en una gasa o teixit net, evitant comprimir el globus ocular. Una altra bona opció és fer un petit forat en una ampolla de plàstic que puguem pressionar amb facilitat, ja que "el rentat ha de ser suau però, alhora, provocar un arrossegament". Així mateix, "si es produeix una ferida a la parpella o la cella que afecta els ulls, cal pressionar la zona impactada per tallar l'hemorràgia, evitant, de nou, comprimir el globus ocular".

En qualsevol cas, el protocol d'actuació de la Fundació IMO indica que l'accidentat ha de ser traslladat ràpidament a un centre hospitalari perquè pugui ser sotmès a un examen de les estructures internes oculars. En aquest sentit, recorda que el dolor, en ocasions, no està relacionat amb la gravetat del procés, de manera que petites ferides poden provocar grans molèsties, mentre que lesions importants poden no ser doloroses. Segons el Dr. Elies, "és imprescindible acudir a l'especialista, qui realment podrà valorar l'abast de la lesió i proporcionar el tractament més adequat".

La campanya informa que la lesió ocular pot ser múltiple i variada i afectar un o dos ulls i que poden produir-se des de petites cremades a les parpelles i erosions a la superfície ocular, fins a mutilacions de teixits i esclat de l'ull amb pèrdua del seu contingut. Tot i que les ferides oculars per explosiu es tracten actualment amb gran èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos, de manera que les mesures de prevenció són fonamentals.